

事務局に ゆーす

NPO 法人岡山県腎臓病協議会

〒700-0807 岡山市北区南方2丁13-1

電話 086-231-1916

No. 176 2020年3月23日

新型コロナウイルス 情報 第2弾！

3月19日(木)、岡山県医師会透析医部会(草野会長)・当会(事務局長)は、岡山県に対し感染防止のための要望書を提出。透析患者感染についての対応。特に透析施設・患者双方のマスク・消毒薬等の不足については優先配布を要望。

(全国の病院で不足、岡山でもシート利用などで対応している)
全腎協・当会では、厚生労働省・厚労大臣に要望書提出。

☆岡山県医師会透析医部会 感染対策委員会より☆

患者さんには、人混みを避ける、体温測定などの健康管理、自己申告、マスク、手洗いなどの基本的な感染対策を引き続きよろしくお願いします。
クラスターが発生した場合には、透析時間を短縮したり、クールや開始時間の変更、場合によっては施設を変わってもらうなどの対応をお願いする可能性もあると考えています。

④ 37.5度前後の熱がある、咳痰、嘔吐、下痢などの症状のある患者は、『事前に通院する病院に電話』し、指示に従ってください。(新型コロナウイルス以外の感染症も引き続き注意)



マスク用とりかえ
シート

重篤化予防に努めよう!

「体重管理=水分管理」
中1日 DWX 3%以内
中2日 DWX 5%以内
※ DW=ドライウェイト
塩分を摂りすぎると喉が渇き
水分を多くとりすぎます。
体内水分が過剰になると心不全・血圧が高くなりすぎます。
また、肺炎などは重篤化する恐れがあります。

ちょっと増えすぎ
ちゃったかなあ



透析入室直前に手洗いしましょう

新型コロナウイルスの集団発生防止にご協力をおねがいします

密を避けて外出しましょう!



①換気の悪い
密閉空間




②多数が集まる
密集場所



③間近で会話や
発声をする
密接場面



新型コロナウイルスへの対策として、クラスター(集団)の発生を防止することが重要です。
イベントや集会で3つの「密」が重ならないよう工夫しましょう。



3つの条件がそろう場所が
クラスター(集団)発生の
リスクが高い!

※3つの条件のほか、共同で使う物品には
消毒などを行ってください。

日本医師会・日本歯科医師会・日本薬剤師会・日本看護協会から
も医療・介護施設・障害者施設・事業所等職員に感染対策通達
しっかり自己管理し、医療崩壊を防ぎましょう!!