

## 日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会報告

### 透析患者の新型コロナウイルス感染者 2020.12.11現在

北海道東北地方 感染者18人(死亡者1人)

東京都 感染者127人(死亡者23人)

関東地区(東京都以外) 感染者108人(死亡者15人)

甲信越・北陸・東海地区 感染者43人(死亡者7人)

近畿地区 感染者93人(死亡者12人)

**中国・四国地区 感染者3人** 九州・沖縄地区 感染者34人(死亡者3人)

**感染者 合計426人 (死亡者61人)**

急増!

### 患者詳細情報

**年代** 40歳未満-6人、40歳代-48人、50歳代-74人(死者7人 致死率9.5%)

**60歳代-92人(死者10人 致死率10.9%)**

**70歳代-105人(死者22人 致死率21.0%)**

**80歳以上-93人(死者22人 致死率23.7%)** 情報なし8人

**性別** 男性 303人 女性 115人 情報なし8人

**原疾患** **糖尿病性腎症-178人(41.8%)**、慢性糸球体腎炎-78人(18.3%)

腎硬化症-47人(11.0%)、その他40人(9.5%)、不明53人(12.4%)

情報なし30人(7.0%)

**症状** **37.5℃以上の発熱、咳嗽、咽頭痛、頭痛、鼻汁、嘔気・嘔吐**  
**下痢、嗅覚味覚異常**

☆当てはまる症状、体調不良があれば  
**病院に行く前に必ず電話連絡!**

- 基礎疾患があると感染しやすく、重症化しやすい。
- 無症状でコロナと診断されていない人が皆さんの周辺に増えていると思われる。
- 感染者がいない地域でも、GoToなどで感染者の往来がある。
- 飲食中のおしゃべりは感染率が高い。

## 岡山県医師会透析医部会より

ここ数週間、全国でコロナウイルス感染者数が急増しています。岡山県でもクラスターが多発しています。感染した透析患者さんは全員指定病院での入院透析治療になります。ひとりひとりの透析患者さんの感染対策が医療崩壊を防ぐことにつながります。感染が多発している地域では、透析時間の短縮や中3日の治療もすでに行われています。日頃から体重増加に注意しカリウムの管理を厳重にしてください。下記事項を守りましょう。

1.朝・昼・晩 検温

2.病院に行く直前に検温、熱があれば電話

3.不調があれば、病院に行く前に必ず電話

※ 発熱、咳嗽、咽頭痛、下痢

頭痛、鼻汁、嘔気・嘔吐、嗅覚味覚異常など不調を感じた場合

4.県外移動は事前に病院に報告しましょう。

県外者との接触、県外から帰省の人との接触は、病院に報告しましょう。

5.更衣室でもマスク着用、飲食はしない。

6.マスクが息で濡れた場合は取替ましょう。

※布製マスクは必ず洗い清潔な物を使用