

## 岡山県まん延防止等重点措置発令！

### 岡山県内の感染状況(2022.1.27現在)

新規756名 累計22,716名 死亡者136名

現在感染者(県内) 6,765名 岡山・倉敷・市広報資料より

入院中 148名・宿泊施設療養 167名・自宅療養 2,602名

中国地方透析患者感染 115名 (死亡10名)急増

全国透析者感染名2,990名(死亡433名)

疾患別 : **糖尿病性腎症1,213名(40.6%)**

慢性糸球体腎炎479名(16%)・腎硬化症327名(11%)その他

資料:日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会

## オミクロンについてわかってきていること

### 特徴

ヒトへの感染力が強く伝播性が高い。

発症までの期間が短く、今までより短期間に広がる。

### 症状

のどの痛み・咳・鼻水などの上気道の症状が多い

### 対策

3密を回避・ワクチン接種

清潔なマスクをしっかりとつける

できれば不織布マスク

※ 基本的対策は今までと変わらずに！

# ご注意ください

- ① 37. 3度以上の発熱・せき・くしゃみ  
鼻水・頭痛・嘔吐・はき気・下痢  
倦怠感などがある場合は、  
**透析施設に行く前に必ず電話**  
医師または医療スタッフの指示を受けて下さい。
- ② 家族や接触のある友人・知人の感染  
や濃厚接触者に該当した場合、  
①の症状が無くても必ず病院に連絡し  
指示を受けて下さい。
- ③ 県外への出張は事前に届出ください。
- ④ 更衣室では長居をせず  
**『無言』『飲食禁止』**をお願いします。

※ 感染の急激な増加が続いており、  
透析患者の場合、今以上の警戒が必要です。  
周囲へ感染を広げないための思い  
やりのある行動をお願いいたします。